

Negrone

Vass4R12s516-520



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp790

*4R12 s 516-520
Negrone*

3182


5

0Mtp790


Maren


Negrone

Vass4R12s516-520









Formulaire de description 2/8
(floraison)

Année :

Observateur

Code cépage : *ni*

Code clone

Nom cépage : *Negrone*

Emplacement *4 R12A516.520*

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte ①

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1 - en liseré ② - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible ③ - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte ④ - très forte 9

oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible ④ - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 - jaune ④ - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne ⑤ - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible ④ - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne ⑤ - forte ④ - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible ④ - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil : étalées 1 - en gouttière ② - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible ②⑧ - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne ②③ - très forte ②④

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible ④ - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne ⑤ - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc ②⑤ - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1^e feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil : plan ① - en gouttière ② - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible ②⑧ - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible ②③ - moyenne ②④ - très forte 225

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible ②⑧ - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible ②⑦ - moyenne ②⑧ - très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible ④ - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible ③ - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune ②⑩ - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes ②③

Formulaire de description 3/8
(floraison)

Année :

Code cépage : *ni*

Code clone :

Nom cépage : *Negrone*

Observateur :

Emplacement *4 R 12 AS 16-520*

Rameau herbacé

oiv 006 **port** : érigé 1 - demi-érigé *2* - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 007 **couleur face dorsale entrenoeuds** : verte *1* - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 008 **couleur face ventrale entrenoeuds** : verte *1* - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 009 **couleur face dorsale noeuds** : verte *1* - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 010 **couleur face ventrale noeuds** : verte *1* - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 011 **densité poils dressés noeuds** : absence *1* - présence 9

oiv 012 **densité poils dressés entrenoeuds** : absence *1* - présence 9

oiv 013 **densité poils couchés noeuds** : nulle ou très faible *1* - moyenne 5 - forte 9

oiv 014 **densité poils couchés entrenoeuds** : nulle ou très faible *1* - moyenne 5 - forte 9

oiv 015 **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible *1* - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 015* **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible *1* - moyenne 2 - forte ou très forte 3

oiv 016 **distribution vrilles** : discontinue (2 ou moins) *1* - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2

oiv 017 **longueur vrilles** : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) *2* - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9

Inflorescence

oiv 151 **sexe de la fleur** : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite *3* - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5

oiv 152 **niveau insertion 1° inflorescence** : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud *2*

oiv 153 **nombre inflorescence/rameau** : 1 ou moins 1 - 1,1 à deux *2* - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée *2*

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244

Couleur des vrilles : verte *260* - jaune *261* - rouge 262 et 263